PATIENTEN-MERKBLATT

THERAPIE MIT XOFIGO

- 1. Nach der Injektion können Sie direkt nach Hause gehen und Ihre normalen Tätigkeiten wieder aufnehmen.
- 2. Bitte trinken Sie nach den Injektionen viel (Wasser, Säfte, Tee), damit das überschüssige Xofigo schnell aus dem Körper und der Harnblase entfernt wird.
- 3. Sie können ganz normalen Kontakt zu Ihrer Familie und Ihrer gewohnten Umgebung haben. Es sind keine Schutzmassnahmen notwendig.
- 4. Xofigo wird über den Urin und den Stuhl ausgeschieden.
 - a. Bitte waschen Sie sich daher nach dem Besuch der Toilette ausgiebig die Hände.
 - **b.** Setzen Sie sich auch zum Wasserlösen immer auf die Toilette.
 - c. Halten Sie die Toilette sauber und spülen Sie bitte immer zweimal nach.
 - d. Waschen Sie die durch Urin und Stuhl verunreinigte Kleidung immer separat von der restlichen Wäsche.
 - e. Bei sexuellen Kontakten benutzen Sie bitte Präservative während und bis zu 6 Monate nach Therapie.
 - f. Falls Sie eine Patientenkarte noch nicht erhalten haben, fragen Sie danach, die Karte weist Sie als Therapie-Patient aus. (An Flughäfen und Grenzkontrollstationen sind sehr sensible Detektoren zum Nachweis von Radioaktivität installiert. Diese können Ihre Therapiesubstanz feststellen und fälschlich Alarm auslösen.)
- 5. Im Notfall bitte zuerst Ihren behandelnden Onkologen / Ihre behandelnde Onkologin kontaktieren.

 Bei Unklarheiten Tel. +41 31 309 94 61 oder an Feiertagen leitet Sie der diensthabende Radiologe im Engeriedspital, Tel. +41 31 358 16 19, an den Nuklearmediziner weiter.

